

Service Communication • Réalisation : Guy Labarthe - Communication Visuelle - Paris

ormations informations



Service de rhumatologie
Responsable : Pr F. BERENBAUM

Biopsie ostéomédullaire

*Fiche d'information réalisée
avec le service de Rhumatologie
de l'hôpital Saint-Antoine*

ASSISTANCE  HÔPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

HÔPITAL SAINT-ANTOINE

184, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75571 Paris Cedex 12

Tél. : 01 49 28 20 00

 saint
antoine

De quoi s'agit-il ?

Cet examen consiste à prélever un fragment d'os au niveau d'une zone superficielle de l'os du bassin, dans le but d'étudier l'architecture de l'os et le bon fonctionnement de la moelle osseuse.

Avant l'examen

répondez attentivement
aux questions suivantes :

Tous ces cas peuvent représenter une contre-indication et il est nécessaire d'en parler à votre médecin avant le geste.

Avez-vous des risques particuliers de saigner ?

- ◆ Avez-vous une maladie du sang ou des saignements fréquents ou prolongés (du nez par exemple) ?
- ◆ Prenez-vous un traitement fluidifiant le sang (anticoagulant, antiagrégant plaquettaire type Aspirine, Asasantine, Kardégic, Persantine, Plavix, Previscan Sintrom, Solupsan, Ticlid...), ou tout simplement souvent de l'Aspirine contre le mal de tête ?

➔ ***Dans ce cas, il sera nécessaire d'arrêter ces médicaments (sauf cas particuliers) avant l'examen ; nous vous préciserons les dates d'arrêt et de reprise ainsi que les éventuels traitements de substitution.***

Le déroulement de l'examen

L'examen s'effectue dans votre chambre, vous êtes allongé sur le ventre. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Une anesthésie locale est réalisée dans le haut de la fesse. La biopsie elle-même est quasiment indolore ou très peu sensible. Le médecin prélève un fragment d'os à l'aide d'une aiguille. L'incision est fermée à l'aide de stéri-strips. Un pansement compressif est mis en place au point de ponction.

Durée de l'examen

La biopsie elle-même dure en moyenne quelques minutes. La préparation est plus longue, environ 15 minutes.

Après l'examen

Un repos strict au lit en position couchée sur le dos pendant une demi-heure vous est imposé. L'anesthésie locale cesse son effet environ une heure après le geste. En cas de douleur au point de ponction, un antalgique par voie orale peut vous être donné. Le pansement compressif doit rester en place pendant 48 heures sur le point de ponction. Vous ne devez pas prendre de douche pendant 48 heures. Les stéri-strips doivent être retirés au bout de 8 jours par une infirmière ou votre médecin traitant.

Quelles complications pourraient survenir ?

Rarement des hématomes, saignements, infections au point de ponction peuvent survenir.

Le résultat de la biopsie nous parviendra dans les 10 jours suivant sa réalisation. N'hésitez pas à contacter votre médecin en cas de douleur importante ou d'écoulement anormal au point de ponction.